EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

Održavanje života novorođenčeta

CRO

Prenatalno savjetovanje
Kratke upute timu i provjera opreme

Porod

Osušite novorođenče
Održavajte normalnu temperaturu
Pokrenite sat ili zabilježite vrijeme

Procijenite (tonus), disanje i srčanu frekvenciju

Ako teško diše ili ne diše
Otvorite dišni put
Primijenite 5 inflacijskih upuha
Razmotrite nadziranje SpO_2 ± monitoriranje EKG-a

Ponovo procijenite
Ako se srčana frekvencija nije povećala
promatrajte pokrete prsnoga koša

Ako nema pokreta prsnoga koša
Ponovo provjerite položaj glave
Razmotrite kontrolu dišnoga puta pomoću dvije osobe
ili druge postupke otvaranja dišnoga puta
Ponovite inflacijske upuhe
Nadziranje SpO_2 ± monitoriranje EKG-a
Gledajte ima li odgovora

Ako se srčana frekvencija nije povećala
promatrajte pokrete prsnoga koša

Kada su pokreti prsnoga koša prisutni
Ako se srčana frekvencija ne može utvrditi
ili je jako spora (<60/min)
Započnite kompresije prsnoga koša
Koordinirajte kompresije i ventilaciju s pozitivnom
tlakom (PPV) u omjeru 3:1

Procjenjujte srčanu frekvenciju svakih 30 sekundi
Ako se srčana frekvencija ne može utvrditi ili je jako
spora (<60/min) razmotrite uspostavljanje krvožilnog
pristupa i primjenu lijekova

Razgovarajte s roditeljima i dajte upute timu

Prihvatljiva preduktalna SpO_2

2 min	60 %
3 min	70 %
4 min	80 %
5 min	85 %
10 min	90 %

60 s

Povisite kisik (vođeno oksimetrijom ako je dostupna)

Tijekom cijelog vremena pitajte: trebate li pomoć?

Održavajte temperaturu

www.erc.edu | info@erc.edu

Objavljeno u Listopadu 2015 European Resuscitation Council vzw, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgium
Autorska prava: © European Resuscitation Council vzw Kataloški broj: Poster_NLS_Algorithm_CRO_20160113